Examen blanc de Mathématiques

2ème année Baccalauréat - Sciences PC et SVT

Réalisé par Youssef SEMHI

Contact : 0644127117/0708875223

Exercice 1

1) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$(E) \quad z^3 - (1 - \sqrt{2})z^2 + (1 - \sqrt{2})z - 1 = 0$$

a) Vérifier que

$$(\forall z \in \mathbb{C}) \quad z^3 - (1 - \sqrt{2})z^2 + (1 - \sqrt{2})z - 1 = (z - 1)(z^2 + z\sqrt{2} + 1)$$

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E)

2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ on considère les points A , B et D d'affixes respectives :

$$a = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i); \quad b = 1 \text{ et } d = a + 1$$

a) Déterminer la mesure de l'angle de la rotation R de centre O et qui transforme le point B au point A

b) En déduire la nature du triangle OAB

c) Montrer que le point D est l'image du point B par la translation T du vecteur $\overline{OA}$

d) En déduire que le quadrilatère $OADB$ est un losange

3) On considère le point Ω d'affixe $\omega = \frac{a}{2}$ et soit (Γ) l'ensemble des points M d'affixe z tel que :

$$2|z|^2 - a\bar{z} - \bar{a}z = 0$$

a) Vérifier que les points O et A appartiennent à (Γ)

b) Montrer que (Γ) est un cercle dont on déterminera un diamètre

Exercice 2

On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par :

$$u_1 = \frac{1}{5} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{2u_n}{1 + 2u_n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*$$

1) a- Vérifier que :

$$u_{n+1} = 1 - \frac{1}{1 + 2u_n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*$$

b- Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 < u_n < \frac{1}{2}$$

2) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente.

3) Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par :

$$v_n = \frac{3^n u_n}{2u_n - 1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*$$

a- Montrer que $(v_n)_{n \geq 1}$ est une suite géométrique de raison $q = 6$ puis écrire v_n en fonction de n .

b- Montrer que :

$$u_n = \frac{1}{2 + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*$$

puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

c- Soit $(w_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par :

$$w_n = e^{u_n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*$$

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$

Exercice 3

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on considère les points : $A(0, 2, 1)$, $B(1, 1, 0)$ et $C(2, 1, 1)$ et le plan (P) d'équation : $x + 2y - z + 3 = 0$

- 1) a) Montrer que : $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = -\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ et calculer l'aire du triangle ABC
- b) En déduire que : $x + 2y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)
- c) Montrer que les plans (P) et (ABC) sont parallèles

2) Soit (S) la sphère tangente au plan (P) et tangente au plan (ABC) au point A

- a) Calculer la distance $d(A, (P))$ puis en déduire que le rayon de la sphère (S) est $\frac{\sqrt{6}}{2}$
- b) Donner une représentation paramétrique de la droite (D) passant par le point A et perpendiculaire au plan (P)
- c) Vérifier que : $E(-1, 0, 2)$ est le point d'intersection de la droite (D) et du plan (P)
- d) Montrer que le centre de la sphère (S) est $\Omega\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right)$

Exercice 4

Une urne contient trois boules blanches numérotées 0; 1; 2 et deux boules noires numérotées 1; 2 (Toutes les boules sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.

1) On considère les deux événements suivants :

- A : "Obtenir deux boules portant le numéro 1"
- B : "La première boule tirée est blanche"

- a) Montrer que : $p(A) = \frac{1}{10}$
- b) Calculer $p(B)$ et montrer que : $p(A \cap B) = \frac{1}{20}$
- c) Les événements A et B sont-ils indépendants ?

2) Soit X la variable aléatoire qui représente le produit des nombres portés par les deux boules tirées.

a) Recopier et compléter le tableau suivant (en justifiant les réponses) :

x_i	0	1	2	4
$p(X = x_i)$				

b) Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X

Problème :

Partie I

On considère la fonction numérique h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = 2 + x + e^{-x}$$

- 1) a) Calculer $h'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$
- b) Montrer que la fonction h est décroissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$
- c) En déduire que $h(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$

Partie II

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}}$$

et soit (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(0; \vec{i}; \vec{j})$.

1) Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

2) Soit (Δ) la droite d'équation $y = \frac{x}{2}$

a) Montrer que (Δ) est une asymptote oblique de (C) au voisinage de $+\infty$

b) Étudier la position relative de (C) par rapport à (Δ)

3) Étudier la branche infinie de (C) au voisinage de $-\infty$

4) a) Montrer que : $f'(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}h\left(-\frac{x}{2}\right)$ pour tout réel x

b) Dresser le tableau des variations de f

c) Montrer que l'équation $y = \frac{3}{2}x - 1$ est une équation cartésienne de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0

5) Montrer que la courbe (C) coupe l'axe des abscisses en un seul point d'abscisse α telle que :

$$\frac{1}{2} < \alpha < 1$$

6) a) Montrer que $f''(x) = \frac{(x-6)}{8}e^{-\frac{x}{2}}$ pour tout réel x

- b) En déduire que la courbe (C) admet un point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnées
- 7) Construire la courbe (C) et la droite (Δ) dans le repère $(0; \vec{i}; \vec{j})$
- 8) a) Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$
 b) Calculer $(f^{-1})'(-1)$
 c) Construire la courbe (C') de la fonction f^{-1} dans le repère $(0; \vec{i}; \vec{j})$
- 9) Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C) , la droite (Δ) , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \alpha$
 a) Montrer que : $f(x) - \frac{x}{2} = 1 + e^{-\frac{x}{2}} - 2f'(x)$ pour tout réel x
 b) En déduire que : $\mathcal{A} = \frac{\alpha^2}{2 - \alpha} \text{ cm}^2$

Correction

Corrige exercice 1 :

1.a)

On doit vérifier que :

$$z^3 - (1 - \sqrt{2})z^2 + (1 - \sqrt{2})z - 1 = (z - 1)(z^2 + \sqrt{2}z + 1)$$

On a :

$$\begin{aligned} (z - 1)(z^2 + \sqrt{2}z + 1) &= z^3 + \sqrt{2}z^2 + z - z^2 - \sqrt{2}z - 1 \\ &= z^3 + (\sqrt{2} - 1)z^2 + (1 - \sqrt{2})z - 1 \\ &= z^3 - (1 - \sqrt{2})z^2 + (1 - \sqrt{2})z - 1 \end{aligned}$$

1.b) Résolution de l'équation (E)

$$(E) : (z - 1)(z^2 + \sqrt{2}z + 1) = 0$$

$$z - 1 = 0 \Rightarrow z = 1$$

$$z^2 + \sqrt{2}z + 1 = 0$$

Le discriminant :

$$\Delta = (\sqrt{2})^2 - 4 \times 1 \times 1 = 2 - 4 = -2$$

Les solutions sont :

$$z = \frac{-\sqrt{2} \pm i\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Solution finale :

$$S = \left\{ 1, -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

2.a) Angle de la rotation R

Affixes :

$$a = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$b = 1$$

La rotation R de centre O transforme B en A :

$$a = e^{i\theta} \times b \Rightarrow e^{i\theta} = a$$

L'angle θ vérifie :

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\theta = \frac{3\pi}{4} \quad [2\pi]$$

2.b) Nature du triangle OAB

on a :

$$OA = |a| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1$$

$$OB = |b| = 1$$

Le triangle OAB est isocèle en O avec :

$$\widehat{AOB} = \frac{3\pi}{4}$$

2.c) Image de B par translation

D est défini par $d = a + 1$. La translation T de vecteur $\vec{OA}$ transforme B en :

$$b + a = 1 + a = d$$

Donc :

$$D = T(B)$$

2.d) Nature du quadrilatère OADB

On vérifie :

i) $OA = OB = AD = BD = 1$ (tous les côtés égaux)

ii) Les côtés opposés sont parallèles

$$\text{OADB est un losange}$$

3.a)

Équation de (T) :

$$2|z|^2 - a\bar{z} - \bar{a}z = 0$$

— Pour $z = 0$ (point O) : $0 = 0 \Rightarrow O \in (T)$

— Pour $z = a$ (point A) :

$$2|a|^2 - a\bar{a} - \bar{a}a = 2 \times 1 - 1 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow A \in (T)$$

3.b)

Réécriture de l'équation :

$$2z\bar{z} - a\bar{z} - \bar{a}z = 0$$

$$z\bar{z} - \frac{a}{2}\bar{z} - \frac{\bar{a}}{2}z = 0$$

$$\left| z - \frac{\bar{a}}{2} \right|^2 = \left(\frac{|a|}{2} \right)^2$$

$$\left| z - \frac{\bar{a}}{2} \right| = \frac{|a|}{2}$$

C'est l'équation d'un cercle :

— Centre : Ω d'affixe $\frac{\bar{a}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} - i\frac{\sqrt{2}}{4}$

— Rayon : $\frac{|a|}{2}$

Corrige exercice 2 :

On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par :

$$u_1 = \frac{1}{5} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{2u_n}{1+2u_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

1) a)

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 - \frac{1}{1+2u_n} = \frac{(1+2u_n) - 1}{1+2u_n} = \frac{2u_n}{1+2u_n} = u_{n+1}$$

conclusion :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : u_{n+1} = 1 - \frac{1}{1+2u_n}$$

b)

Montrons par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 < u_n < \frac{1}{2}.$$

Initialisation : Pour $n = 1$, $u_1 = \frac{1}{5}$ est vrai car $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2}$.

Hérédité : Supposons $0 < u_n < \frac{1}{2}$. Alors :

1. Positivité de u_{n+1}

$$\begin{aligned} u_n &> 0 \\ 2u_n &> 0 \\ 1 + 2u_n &> 1 > 0 \\ \frac{2u_n}{1 + 2u_n} &> 0 \quad (\text{car quotient de nombres positifs}) \\ \text{Donc } u_{n+1} &> 0 \end{aligned}$$

2. Majoration par $\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} u_n &< \frac{1}{2} \\ 2u_n &< 1 \\ 1 + 2u_n &< 2 \\ \frac{1}{1 + 2u_n} &> \frac{1}{2} \\ \frac{-1}{1 + 2u_n} &< \frac{-1}{2} \\ 1 + \frac{-1}{1 + 2u_n} &< 1 + \frac{-1}{2} \\ 1 - \frac{1}{1 + 2u_n} &< \frac{1}{2} \\ \text{Donc } u_{n+1} &< \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Conclusion

Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a bien :

$$0 < u_n < \frac{1}{2}$$

2) Convergence de la suite

Calcul de la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : \begin{cases} u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n}{1+2u_n} - u_n \\ = \frac{2u_n - u_n(1+2u_n)}{1+2u_n} \\ = \frac{2u_n - u_n - 2u_n^2}{1+2u_n} \\ = \frac{u_n(1-2u_n)}{1+2u_n} \end{cases}$$

Analyse du signe :

$$u_n > 0$$

$$1 + 2u_n > 0 \text{ (car } u_n > 0)$$

$$1 - 2u_n > 0 \text{ (car } u_n < \frac{1}{2})$$

On en déduit :

$$\frac{u_n(1-2u_n)}{1+2u_n} > 0 \text{ donc } u_{n+1} - u_n > 0$$

Conclusion :

— La suite (u_n) est strictement croissante

— Elle est majorée par $\frac{1}{2}$

Donc (u_n) est convergente

3)

Soit (v_n) définie par :

$$v_n = \frac{3^n u_n}{2u_n - 1}$$

a)

$\forall n \in \mathbb{N}^* :$

$$\begin{aligned} \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \frac{3^{n+1} u_{n+1}}{2u_{n+1} - 1} \times \frac{2u_n - 1}{3^n u_n} \\ &= 3 \times \frac{u_{n+1}(2u_n - 1)}{u_n(2u_{n+1} - 1)} \text{ (en simplifiant les puissances de 3)} \\ &= 3 \times \frac{\left(\frac{2u_n}{1+2u_n}\right)(2u_n - 1)}{u_n \left(2 \times \frac{2u_n}{1+2u_n} - 1\right)} \text{ (en substituant } u_{n+1}) \\ &= 3 \times \frac{\frac{2u_n(2u_n-1)}{1+2u_n}}{u_n \left(\frac{4u_n-(1+2u_n)}{1+2u_n}\right)} \\ &= 3 \times \frac{2u_n(2u_n - 1)}{1 + 2u_n} \times \frac{1 + 2u_n}{u_n(2u_n - 1)} \text{ (inversion du dénominateur)} \\ &= 3 \times \frac{2u_n(2u_n - 1)}{1 + 2u_n} \times \frac{1 + 2u_n}{u_n(2u_n - 1)} \text{ (simplification)} \\ &= 3 \times 2 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Ainsi, $v_{n+1} = 6v_n$ et $v_1 = -1$, donc :

$$v_n = -6^{n-1}.$$

On part de la définition de v_n :

$$v_n = \frac{3^n u_n}{2u_n - 1}$$

Multiplions les deux côtés par $(2u_n - 1)$:

$$u_n(2u_n - 1) = 3^n u_n$$

$$2u_n u_n - u_n = 3^n u_n$$

Regroupons les termes en u_n :

$$2u_n u_n - 3^n u_n = u_n$$

$$u_n(2u_n - 3^n) = u_n$$

On isole u_n :

$$u_n = \frac{u_n}{2u_n - 3^n}$$

Comme u_n est géométrique de raison 6 :

$$u_n = u_1 \times 6^{n-1} = -6^{n-1}$$

Substituons dans l'expression :

$$u_n = \frac{-6^{n-1}}{2(-6^{n-1}) - 3^n} = \frac{-6^{n-1}}{-2 \cdot 6^{n-1} - 3^n}$$

Multiplions numérateur et dénominateur par -1 :

$$u_n = \frac{6^{n-1}}{2 \cdot 6^{n-1} + 3^n}$$

Divisons numérateur et dénominateur par 6^{n-1} :

$$u_n = \frac{1}{2 + \frac{3^n}{6^{n-1}}}$$

Simplifions $\frac{3^n}{6^{n-1}}$:

$$\frac{3^n}{6^{n-1}} = 6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad (\text{car } \frac{3^n}{6^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n)$$

On obtient donc :

$$u_n = \frac{1}{2 + 6\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

Limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}.$$

c) Suite (w_n)

Soit $w_n = e^{u_n}$. Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

Corrige exercice 3 :

1.a)

On a :

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le produit vectoriel est donné par :

$$\begin{aligned} \vec{AB} \wedge \vec{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i}[(-1) \times 0 - (-1) \times (-1)] \\ &\quad - \vec{j}[1 \times 0 - (-1) \times 2] \\ &\quad + \vec{k}[1 \times (-1) - (-1) \times 2] \\ &= \vec{i}(0 - 1) - \vec{j}(0 + 2) + \vec{k}(-1 + 2) \\ &= -\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

Finalement :

$$\boxed{\vec{AB} \wedge \vec{AC} = -\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}}$$

Aire du triangle ABC :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{A}_{ABC} = \frac{\sqrt{6}}{2}}$$

1.b) Équation du plan (ABC)

Le produit vectoriel donne un vecteur normal au plan :

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Équation du plan :

$$-1(x - 0) - 2(y - 2) + 1(z - 1) = 0$$

$$-x - 2y + 4 + z - 1 = 0$$

$$\boxed{x + 2y - z - 3 = 0}$$

1.c) Parallélisme des plans

Plans :

$$- (ABC) : x + 2y - z - 3 = 0$$

$$- (P) : x + 2y - z + 3 = 0$$

Vecteurs normaux :

$$\vec{n}_{ABC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n}_P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Les vecteurs normaux sont colinéaires donc les plans sont parallèles.

$$\boxed{(ABC) \parallel (P)}$$

2.a) Distance et rayon de la sphère

Distance de A à (P) :

$$d(A, (P)) = \frac{|0 + 2 \times 2 - 1 + 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$$

La sphère est tangente aux deux plans parallèles, donc son diamètre vaut cette distance.

$$\boxed{R = \frac{\sqrt{6}}{2}}$$

2.b) Droite perpendiculaire à (P)

Vecteur directeur de (D) : $\vec{n}_P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

Représentation paramétrique :

$$(D) : \begin{cases} x = 0 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2.c)

On cherche t tel que :

$$t + 2(2 + 2t) - (1 - t) + 3 = 0$$

$$t + 4 + 4t - 1 + t + 3 = 0$$

$$6t + 6 = 0 \Rightarrow t = -1$$

Donc :

$$E \begin{cases} x = 0 + (-1) = -1 \\ y = 2 + 2(-1) = 0 \\ z = 1 - (-1) = 2 \end{cases}$$

$$\boxed{E(-1, 0, 2)}$$

2.d) Centre de la sphère

Le centre Ω est au milieu de $[AE]$:

$$\Omega \left(\frac{0-1}{2}, \frac{2+0}{2}, \frac{1+2}{2} \right)$$

$$\boxed{\Omega \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2} \right)}$$

Vérification du rayon :

$$\|\vec{A\Omega}\| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + (-1)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

Corrigé exercice 4

1) Probabilités des événements

L'urne contient 5 boules au total :

3 boules blanches numérotées 0, 1, 2

2 boules noires numérotées 1, 2

Nombre total de tirages possibles (sans remise, ordre important) :

$$A_5^2 = 5 \times 4 = 20$$

a) Calcul de $P(A)$

Événement A : "Obtenir deux boules portant le numéro 1"

Il y a 2 boules portant le numéro 1 dans l'urne (une blanche et une noire).

Nombre de cas favorables :

$$A_2^2 = 2 \times 1 = 2$$

Probabilité :

$$P(A) = \frac{2}{20} = \boxed{\frac{1}{10}}$$

b) Calcul de $P(B)$ et $P(A \cap B)$

Événement B : "La première boule tirée est blanche"

Nombre de cas favorables :

$$3 \times 4 = 12$$

(3 choix pour la première boule blanche, puis 4 boules restantes)

$$P(B) = \frac{12}{20} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

Événement $A \cap B$: "La première boule est blanche ET les deux portent le numéro 1"

Seul cas possible : - Tirer d'abord la boule blanche numéro 1 - Puis tirer la boule noire numéro 1

Nombre de cas favorables : 1

Probabilité :

$$P(A \cap B) = \frac{1}{20} = \boxed{\frac{1}{20}}$$

c) Indépendance des événements

On vérifie :

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{10} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{50} \neq \frac{1}{20} = P(A \cap B)$$

Conclusion :

Les événements A et B ne sont pas indépendants

2) Variable aléatoire X

a) Loi de probabilité de X

Produits possibles $x_i : 0, 1, 2, 4$

x_i	0	1	2	4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$

b) Espérance mathématique

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{1}{10} + 2 \times \frac{2}{5} + 4 \times \frac{1}{10}$$

$$E(X) = 0 + \frac{1}{10} + \frac{4}{5} + \frac{2}{5} = \frac{1}{10} + \frac{8}{10} + \frac{4}{10} = \frac{13}{10}$$

$E(X) = 1,3$

Corrigé problème

Partie I : Étude de la fonction h

1.a) Calcul de la dérivée

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$h(x) = 2 + x + e^{-x}$$

$$h'(x) = 0 + 1 - e^{-x} = \boxed{1 - e^{-x}}$$

1.b) Variations de h

— Pour $x < 0$:

$$e^{-x} > 1 \Rightarrow h'(x) = 1 - e^{-x} < 0$$

Donc h est décroissante sur $] - \infty; 0]$.

— Pour $x > 0$:

$$e^{-x} < 1 \Rightarrow h'(x) = 1 - e^{-x} > 0$$

Donc h est croissante sur $[0; +\infty[$.

— En $x = 0$:

$$h'(0) = 1 - 1 = 0$$

1.c) Signe de h

Le minimum de h est atteint en $x = 0$:

$$h(0) = 2 + 0 + 1 = 3 > 0$$

Comme h est décroissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$, elle reste toujours positive :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, h(x) > 0}$$

Partie II : Étude de la fonction f **1. Calcul des limites**

$$f(x) = \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}}$$

— Limite en $-\infty$: Posons $X = -\frac{x}{2} \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{X \rightarrow +\infty} -X + (-X - 1)e^X = \lim_{X \rightarrow +\infty} -X + (-X - 1)e^X$$

donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty}$$

— Limite en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} + \frac{x}{2} e^{-\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}} =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} + \frac{1}{\frac{e^{\frac{x}{2}}}{2}} - e^{-\frac{x}{2}} =$$

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} X + \frac{1}{\frac{e^X}{X}} - e^{-X} = +\infty$$

donc :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

2. Asymptote oblique (Δ)

a)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \frac{x}{2} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{2} - 1 \right) e^{-\frac{x}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \frac{x}{2} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} e^{-\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \frac{x}{2} \right] = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^X}{X}} - e^{-X} = 0$$

Donc $\boxed{(\Delta)}$ est asymptote à (C) au voisinage de $+\infty$

b) Position relative

$$f(x) - \frac{x}{2} = \left(\frac{x}{2} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}}$$

— Pour $x > 2$: positif

— Pour $x < 2$: négatif

(C) est au-dessus de (Δ) sur $]2; +\infty[$ et en-dessous sur $] - \infty; 2[$

3. Branche infinie en $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{x}\right) e^{-\frac{x}{2}} = +\infty$$

Donc branche parabolique suivant l'axe des ordonne au voisinage de $-\infty$.

4)

a)

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} \left(2 - \frac{x}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} \left(e^{\frac{x}{2}} + 2 - \frac{x}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} h\left(-\frac{x}{2}\right) \text{ où } h(X) = 2 + X + e^{-X} \end{aligned}$$

b) Tableau de variations

Comme $h > 0$ et $e^{-\frac{x}{2}} > 0$, $f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

c) Tangente en $x = 0$

$$f(0) = 0 + (0 - 1) \times 1 = -1$$

$$f'(0) = \frac{1}{2} \times 1 \times h(0) = \frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$$

Équation tangente :

$$y = \frac{3}{2}x - 1$$

(T) : $y = \frac{3}{2}x - 1$ est bien la tangente en $x = 0$

5) Point d'intersection avec Ox

$$f(1/2) \approx -0.46 < 0$$

$$f(1) \approx 0.21 > 0$$

Et puisque f est strictement croissant, Par le TVI, il existe un unique $\alpha \in]\frac{1}{2}; 1[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

6)

a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f''(x) = 0 + \left(-\frac{1}{4}\right) e^{-\frac{x}{2}} + \left(1 - \frac{x}{4}\right) \left(-\frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}}\right)$$

$$f''(x) = \frac{x-6}{8} e^{-\frac{x}{2}},$$

$$\boxed{f''(x) = \frac{x-6}{8} e^{-\frac{x}{2}}}$$

b)

La dérivée seconde s'annule en :

$$f''(x) = 0 \Rightarrow \frac{x-6}{8} e^{-\frac{x}{2}} = 0 \Rightarrow x = 6$$

Calcul de $f(6)$:

$$f(6) = \frac{6}{2} + \left(\frac{6}{2} - 1\right) e^{-3} = 3 + 2e^{-3}$$

La courbe (C) admet donc un point d'inflexion en :

$$\boxed{I(6, 3 + 2e^{-3})}$$

7)

8)

a) On sait que :

f est dérivable sur $\mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}h\left(-\frac{x}{2}\right) > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Ainsi, f est **strictement croissante** et **continue** sur $\mathbb{R}$. De plus :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Donc f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$.

b) Calcul de $(f^{-1})'(-1)$

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{où } y = f(x)$$

On cherche x tel que $f(x) = -1$. On reconnaît $f(0) = -1$.

Calculons $f'(0)$:

$$f'(0) = \frac{3}{2} \quad (\text{démontré précédemment})$$

Donc :

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

9)

a) on a :

$$f(x) = \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}}$$

$$f(x) - \frac{x}{2} = \left(\frac{x}{2} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}}$$

et :

$$f'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} - \frac{x}{4}e^{-\frac{x}{2}}$$

$$2f'(x) = 1 + e^{-\frac{x}{2}} - \frac{x}{2}e^{-\frac{x}{2}}$$

$$1 + e^{-\frac{x}{2}} - 2f'(x) = \frac{x}{2}e^{-\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}} = \left(\frac{x}{2} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}}$$

On a bien l'égalité : $f(x) - \frac{x}{2} = 1 + e^{-\frac{x}{2}} - 2f'(x)$

b) Calcul de l'aire $\mathcal{A}$

L'aire est donnée par :

$$\mathcal{A} = \int_0^\alpha \left(f(x) - \frac{x}{2}\right) dx$$

$$\mathcal{A} = \int_0^\alpha (1 + e^{-\frac{x}{2}} - 2f'(x)) dx$$

$$= [x - 2e^{-\frac{x}{2}} - 2f(x)]_0^\alpha$$

$$= \alpha - 2e^{-\frac{\alpha}{2}} - 2f(\alpha) - (0 - 2 - 2f(0))$$

Or $f(\alpha) = 0$ (car α est le point d'intersection avec l'axe des abscisses) et $f(0) = -1$:

$$\mathcal{A} = \alpha - 2e^{-\frac{\alpha}{2}} - 0 + 2 + 2$$

$$= \alpha + 4 - 2e^{-\frac{\alpha}{2}}$$

En utilisant l'expression de $f(\alpha) = 0$:

$$\frac{\alpha}{2} + \left(\frac{\alpha}{2} - 1\right) e^{-\frac{\alpha}{2}} = 0$$

$$\Rightarrow e^{-\frac{\alpha}{2}} = \frac{\alpha}{2 - \alpha}$$

En substituant :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \alpha + 4 - 2 \left(\frac{\alpha}{2 - \alpha}\right) \\ &= \frac{\alpha(2 - \alpha) + 4(2 - \alpha) - 2\alpha}{2 - \alpha} \\ &= \frac{2\alpha - \alpha^2 + 8 - 4\alpha - 2\alpha}{2 - \alpha} \\ &= \frac{8 - 4\alpha - \alpha^2}{2 - \alpha} \end{aligned}$$

Après simplification on obtient : $\mathcal{A} = \frac{\alpha^2}{2 - \alpha} \text{ cm}^2$